



## ÇA FONCTIONNE

« Nous avons démontré qu'en mélange avec du manzate ou du captane, Syllit offre une suppression de la tavelure du pommier équivalente à celle que procurent les produits commerciaux de référence (mélange captane/mancozèbe) »

- Kerik Cox

Université Cornell, NY

© 2012 Syllit® est fabriqué par/est une marque déposée de Chimac-Agrifar S.A. Consulter l'étiquette du produit pour connaître toutes les directives et les mesures préventives avant d'utiliser Syllit®.

## Introducing

# SYLLIT® 400 FL

### DOSES

Culture	Rate
Pommes - tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> )	1,75 à 3,65 L/ha en association avec un autre produit, de la pointe verte jusqu'à la floraison. Appliquer au besoin ou à intervalles de 7 jours.
Poires - tavelure ( <i>Venturia pirina</i> )	5,28 L/ha à intervalles de 7 jours ou au besoin, pour maîtriser la tavelure du poirier entre la préfloraison et le premier traitement posfloral.


Note : ne pas faire plus de deux applications de Syllit par année.

### GESTION DE LA RÉSISTANCE

- Dans la mesure du possible, alterner l'utilisation de Syllit 400 FL et des autres fongicides du groupe U12 avec des produits d'autres groupes qui suppriment les mêmes pathogènes.
- Utiliser des mélanges en cuve avec un fongicide d'un groupe différent, quand cette utilisation est permise. Les fongicides devraient être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire intégrée associant dépistage, registre historique des pesticides utilisés, rotation des cultures et mesures de lutte culturales, biologiques et chimiques.

### RÉSULTATS D'ESSAIS COMMERCIAUX RÉALISÉS EN 2011 PAR :

Jeff Alicandro, Agr. Assistance; Butch Palmer, Reality Research; Robin Spitko, NEFCON



### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Groupe de fongicides :** U-12; **Matière active :** dodine

**Délai de sécurité après traitement :** 48 heures; **Délai de sécurité avant la récolte :** 7 jours

**Formulation :** suspension concentrée; **Conditionnement :** 1 caisse contient 4 bidons de 4 L

**Toujours lire les directives de l'étiquette et s'y conformer.**

Pour des renseignements techniques, appeler sans frais au : 877-721-3110



NORAC CONCEPTS INC. , C.P. 31097, GUELPH (ONTARIO) N1H 8K1  
Tél. : (519)-821-3633; télécopieur :(519) 821-2083; [www.noracconcepts.com](http://www.noracconcepts.com)



**Nouveau**

# SYLLIT® 400 FL

## POURQUOI SYLLIT?

- Sa formulation liquide pratique a fait ses preuves contre la tavelure.
- Il résiste à l'entraînement par la pluie en deux heures parce qu'il pénètre à travers la surface des feuilles.
- Il peut être appliqué sur un feuillage mouillé et à basse température (jusqu'à 6 °C).
- Il peut supprimer la tavelure très tôt en saison, avant l'apparition des feuilles.
- Il exerce un effet rétroactif s'il est appliqué dans les 48 heures suivant une infection.
- Il offre une action préventive et curative.

## MODE D'ACTION


Syllit est un agent pénétrant à action locale. Son ingrédient actif est la dodine, un fongicide qui agit en éliminant les lipides des membranes cellulaires des champignons.

## DES AVANTAGES INCOMPARABLES

	Captane/mancozèbe	Syllit mélangé à des fongicides de contact
Effet préventif	Oui	Oui
Effet curatif en 48 heures	Non	Oui
Résistance à l'entraînement par la pluie	Superficiel, lessivé après 20 minutes sous la pluie	Syllit mélangé à des fongicides de contact
Applicable sur feuillage mouillé	Oui	Oui
Actif à basse température (6°C)	Oui	Oui

## CALENDRIER DE TRAITEMENT DE SYLLIT

Utiliser Syllit à raison de 1,75 à 3,65 L/ha, en mélange avec 2,25 kg de captane (m.a.) à l'hectare (2,80 kg de Maestro 80DF ou de Supra Captan 80WDG) ou avec 2,52 kg de mancozèbe (m.a.) à l'hectare (3,36 kg de Dithane 75DG, de Manzate Pro-Sick ou de Penncozeb 75DF). Consulter l'étiquette du produit.



Éclatement des bourgeons

pointe verte

bouton vert

pré-bouton rose

bouton rose

floraison

chute des pétales

nouaison

**SYLLIT® 400 FL**

**Tous les moyens**

**doivent être mis**

**en œuvre pour**

**contrer la**

**résistance.**